

ЛІКАР ДОВГО ЇДЕ, У ДИТИНИ ФЕБРИЛЬНІ СУДОМИ: ПЕРША ДОПОМОГА



ФЕБРИЛЬНІ СУДОМИ – це судоми, які виникають у відповідь на високу температуру тіла (зазвичай вище 38,5°C). Найчастіше трапляються у дітей до 6 років.

Ознаки:

- гаряча на дотик, почервоніла шкіра;
- температура вище 38,5°C;
- мимовільне посмикування м'язів.

Що робити при фебрильних судомах?

Головне – якомога швидше знизити температуру. Зателефонуйте лікарю або 103, щоб отримати чіткі інструкції.

Під час нападу:

- Будьте поруч і слідкуйте, щоб дитина не вдарилася.
- Приберіть навколишні предмети.
- Не намагайтеся діставати язик – він теж скорочується, але не «западає».

Після нападу:

- Перевірте, чи дитина дихає.
- Забезпечте доступ свіжого повітря – відчиніть вікна.
- Зробіть вологе обтирання прохолодною водою: прикладіть змочену тканину до ділянок із великими судинами – шия, пах, підколінні ямки, зап'ястя.



У РАЗІ НОВОГО ПОГІРШЕННЯ СТАНУ – НЕГАЙНО ВИКЛИКАЙТЕ 103 АБО 112.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

0 800 332 656



Більше про нашу діяльність

